

Vaccino contro	Forma	Quando si fa	Possibili effetti collaterali	Conseguenze della malattia
<b>Difterite</b>	Esavalente	A 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi (10 mesi in Italia) . Richiamo a 18 mesi e poi 6 anni. A 16 anni: difterite, tetano, pertosse (trivalente).	Solitamente lieve gonfiore sul punto dell'iniezione e meno frequentemente lieve rialzo della temperatura entro ventiquattrore dall'iniezione.	Le membrane difteriche possono provocare completa ostruzione delle vie respiratorie con conseguente morte.
<b>Tetano</b>				Morte per asfissia (paralisi della respirazione).
<b>Emofilo (Hib)</b>				Morte per meningite (danni cerebrali gravi).
<b>Epatite B</b>				Lesioni gravi del fegato e insufficienza epatica.
<b>Pertosse</b>				I piu' piccolo (sotto l'anno di vita soffocamento e danni cerebrali per mancanza ossigeno.
<b>Polio per iniezione (Salk)</b>				Paralisi del corpo, danni cerebrali permanenti che possono anche portare alla morte.
<b>Pneumococco (per I bambini 13 ceppi) contro polmonite e meningite</b>	Iniezione singola	2 mesi, 4 mesi, 6 mesi (10 mesi in italia). Richiamo a 18 mesi e poi 6 anni. Richiamo 23 ceppi dai 16 anni in poi.	Lieve infiammazione sul punto dell'iniezione e raramente febbre, anche alta.	La polmonite puo uccidere i bambini piu' piccoli per asfissia.

<b>Morbillo</b>	Trivalente (o tetravalente se include varicella-questo e' consigliato)	Intorno 15 mesi e poi fra i 2-4 anni la seconda dose.	Può causare una febbre, anche alta (39 °C), che inizia fra 4 e 12 giorni dall'iniezione e può durare al massimo due o tre giorni. Questa può essere accompagnata o seguita da una lieve eruzione di macchiette sul tronco e sul volto. In altre parole si può verificare una lieve forma di morbillo, ma senza le complicazioni che possono seguire la malattia naturale. Inoltre una ghiandola linfatica dell'inguine dallo stesso lato dell'iniezione può gonfiarsi per qualche settimana. L'unico rimedio da usare in caso di febbre alta è il paracetamolo	Morte per meningite.
<b>Rosolia</b>			Nessun effetto	Se preso da una donna in gravidanza causa deformazioni gravi del feto.

<b>Parotite</b>			Può raramente causare una lieve forma di parotite, ma senza alcuna conseguenza dannosa permanente. Può essere necessario somministrare il paracetamolo.	Morte per Meningite.
<b>Varicella</b>	Iniezione singola	Insieme alla trivalente: Intorno 15 mesi e poi fra i 2-4 anni la seconda dose.	Arrossamento e dolore nel punto dell'iniezione. Raramente si sviluppa l'eruzione tipica della varicella, ma molto limitata (2-5 bollicine) da 5 a 26 giorni dopo l'iniezione.	Morte per Meningite.
<b>Meningite da meningococco ACWY</b>	Iniezione singola	In unica dose dai 2 anni in su.	Solitamente lieve gonfiore sul punto dell'iniezione e meno frequentemente lieve rialzo della temperatura entro ventiquattrore dall'iniezione.	Morte per Meningite.
<b>Meningite da meningococco B</b>	Iniezione singola	In due dosi a 4 mesi e poi 18 mesi.	Solitamente lieve gonfiore sul punto dell'iniezione e meno frequentemente lieve rialzo della temperatura entro ventiquattrore dall'iniezione.	Morte per Meningite.

<b>Rotavirus (orale)</b>	Orale	A 2 mesi e poi ripetuto a 4 mesi	Abbaastanza comuni sono dolori forti gastrointestinali per qualche giorno dopo la somministazione	Morte per gastroenterite grave (disidratazione).
<b>HVP (virus papilloma)</b>	Iniezione singola	11/12 anni	Guardasil puo' provocare lieve senso di malessere generale	Cancro della cervice uterina o cancro del pene.
<b>Influenza</b>	Iniezione singola	Raccomandata annualmente inizio autunno dai 6 mesi in su.	Solitamente lieve gonfiore sul punto dell'iniezione e meno frequentemente lieve rialzo della temperatura entro ventiquattrore dall'iniezione.	Morte per polmonite/ soffocamento. Raramente danni irreparabili al cervello .
<b>Epatite A</b>	Iniezione singola	Solamente in viaggio. Se si vuole un immunita' permanente 12 mesi a 23 mesi (o almeno 6 mesi dopo la prima)	Solitamente lieve gonfiore sul punto dell'iniezione	Danni al fegato anche acuti e definitivi e gravi con insufficienza completa epatica.
<b>Febbre Gialla</b>	Iniezione singola	Solamente in viaggio se necessario	Solitamente lieve gonfiore sul punto dell'iniezione	Insufficienza renale/ epatica.